



Veille Sanitaire
Internationale
Plateforme ESV



BHV-SV 2022/52
Mois de décembre 2022 et janvier 2023
semaine 52
du 26 décembre 2022 au 01 janvier 2023

Bulletin Hebdomadaire de Veille Sanitaire Internationale en Santé Végétale

Le Bulletin Hebdomadaire de Veille sanitaire internationale en Santé Végétale (BHV-SV) s'inscrit dans l'activité de veille sanitaire internationale menée dans le cadre de la Plateforme ESV (Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale -<https://www.plateforme-esv.fr/>). Le BHV-SV sélectionne et résume des actualités sanitaires et scientifiques en santé végétale qui sont parues dans la semaine.

ATTENTION : Le contenu du document n'engage pas les membres de la Plateforme ESV.



**Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale
CC BY-NC-ND**

Code juridique

Conformément aux productions réalisées par la Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale (ESV), celle-ci donne son droit d'accès à une utilisation partielle ou entière par les médias, à condition de ne pas apporter de modification, de respecter un cadre d'usage bienveillant et de mentionner la source © <https://plateforme-esv.fr/>

Confiance + est un indicateur sur la crédibilité des sites de diffusion (+ : peu fiable à +++ : très fiable, source officielle majoritairement).

Sommaire

<i>Bactrocera dorsalis</i>	2
<i>Candidatus Liberibacter</i> spp., agent causal du huanglongbing (greening des agrumes) et ses vecteurs (<i>Diaphorina citri</i> , <i>Trioza erytreae</i>)	2
<i>Xylella fastidiosa</i>	3

<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> Tropical race 4	3
<i>Popillia japonica</i>	4

Bactrocera dorsalis

Veille scientifique

Dans cet article, l'efficacité de mélanges de leurres attractifs dans des pièges appâtés a été testée sur les mouches des fruits *Bactrocera zonata*, *Bactrocera dorsalis* et *Zeugodacus cucurbitae* naturellement présentes dans des champs commerciaux de goyave et de légumes atteints de la mosaïque au Pakistan. Les résultats suggèrent que l'utilisation d'un mélange spécifique devrait être ajusté en fonction de l'espèce cible. Pour les espèces de *Bactrocera*, un mélange 40CL (cure lue):60ME (méthyl eugénol) dans des pièges appâtés est probablement plus efficace pour réduire leur abondance. Pour cibler de manière efficace *Z. cucurbitae*, les pièges appâtés d'un mélange 10CL:90ME sont plus appropriés.

Titre	Categorie	Lien
Efficacy of lure mixtures in baited traps to attract different fruit fly species in guava and vegetable fields	Mesures de lutte, Mesures de surveillance	lien

Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing (greening des agrumes) et ses vecteurs (*Diaphorina citri*, *Trioza erytreae*)

En utilisant des traits morphologiques et des analyses ADN, l'identité des insectes suspects trouvés au Ghana été confirmée comme étant *D. citri* et *T. erytreae*. Il s'agit de la première détection de ces insectes vecteurs du HLB dans ce pays. Aucun des individus de *D. citri* et *T. erytreae* testés à l'aide de la méthode qPCR n'a été révélé positif au HLB pour les trois espèces de *Liberibacter* (CLaf, CLam et CLas).

Titre	Categorie	Lien
First report on the presence of the huanglongbing vectors in Ghana	Notifications de nouveaux cas	lien

Xylella fastidiosa

Veille sanitaire prioritaire

Une zone délimitée a été établie au Portugal dans les municipalités d'Alijó et de Murça (région Nord), à la suite de la confirmation de la présence de *Xylella fastidiosa*. Les paroisses partiellement couvertes par la Zone Délimitée sont pour (1) la municipalité d'Alijó : Carlão et Amieiro, Pies, Populo, Ribalonga, Sainte Eugénie et Vila Cha; et pour (2) la municipalité de Murça : Noura et Palheiros.

Titre	Categorie	PaysSujet	PaysJournal	Fiabilite	Lien
Zone délimitée pour <i>Xylella fastidiosa</i> à Alijó	Evaluation de l'état sanitaire	Portugal	Portugal	+	lien
<i>Xylella</i> confirmée dans les municipalités de Leiria et Alijó	Evaluation de l'état sanitaire	Portugal	Portugal	+	lien

Veille sanitaire secondaire

Cette page facebook informe de l'état sanitaire de l'Italie concernant *Xylella fastidiosa*.

Titre	Categorie	PaysSujet	PaysJournal	Fiabilite	Lien
infoxylella.it - Home	Communication / vulgarisation	Italie	/	+	lien

Fusarium oxysporum f. sp. *cubense* Tropical race 4

Veille sanitaire prioritaire

Des symptômes causés par Foc TR4 auraient été identifiés dans l'archipel des Comores dans certains milieux agricoles, notamment à Ngazidja, Ndzواني, Mwali, Madjeweni et Ntsinimwapanga. Des échantillons sont actuellement en cours d'analyse en laboratoire.

Titre	Categorie	PaysSujet	PaysJournal	Fiabilite	Lien
Fusariose de bananier I Les symptômes de la race 4 identifiés à Ngazidja	Notifications de nouveaux cas	Comores	/	+	lien

Popillia japonica

Veille sanitaire secondaire

Un dispositif de surveillance du scarabée japonais a été mis en place dans le Vaucluse par les experts de FREDON PACA. Ce travail de surveillance a été réalisé entre avril et octobre 2022, avec 94 examens visuels et 35 pièges posés dans une grande variété d'exploitations. *Popillia japonica* n'a pas été détecté.

Titre	Categorie	PaysSujet	PaysJournal	Fiabilite	Lien
Aucun scarabée japonais observé en France, mais déjà des pièges installés dans le Vaucluse	Mesures de surveillance	France	France	+	lien