

Bulletin Hebdomadaire de Veille Sanitaire Internationale en Santé Végétale

Le Bulletin Hebdomadaire de Veille sanitaire internationale en Santé Végétale (BHV-SV) s'inscrit dans l'activité de veille sanitaire internationale menée dans le cadre de la Plateforme ESV (Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale -<https://www.plateforme-esv.fr/>). Le BHV-SV sélectionne et résume des actualités sanitaires et scientifiques en santé végétale qui sont parues dans la semaine.

ATTENTION : Le contenu du document n'engage pas les membres de la Plateforme ESV.



**Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale
CC BY-NC-ND**

Code juridique

Conformément aux productions réalisées par la Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale (ESV), celle-ci donne son droit d'accès à une utilisation partielle ou entière par les médias, à condition de ne pas apporter de modification, de respecter un cadre d'usage bienveillant et de mentionner la source © <https://plateforme-esv.fr/>

Sommaire

Veille non ciblée (<i>Meloidogyne</i> spp.).....	2
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	3
Dépérissement de la vigne.....	3
<i>Agrilus planipennis</i>	4
<i>Toumeyella parvicornis</i>	4

Veille non ciblée (*Meloidogyne* spp.)

Veille scientifique

Les nématodes à galles (*Meloidogyne* spp.) causent des dégâts significatifs en production maraîchère en Géorgie. Cette étude évalue le potentiel de reproduction de *M. enterolobii* (nématode du goyavier, classé organisme de quarantaine prioritaire en France), *M. floridensis* (nématode du pêcher) et *M. incognita* sur huit cultures maraîchères économiquement importantes : betterave, brocoli, chou, melon, poivron, haricot vert, courge et tomate. Les deux premières espèces ont été détectées pour la première fois en Géorgie lors d'une prospection récente.

Titre	Categorie	Lien
Comparative Reproductive Potential of <i>Meloidogyne enterolobii</i> , <i>M. floridensis</i> , and <i>M. incognita</i> on Major Vegetable Crops in Georgia, USA	Evolution de l'état sanitaire	lien

Bursaphelenchus xylophilus

Veille scientifique

Cette étude examine l'influence de la composition des peuplements forestiers sur l'occurrence de la maladie du flétrissement causée par *Bursaphelenchus xylophilus* dans les forêts de *Pinus massoniana* de la région du barrage des Trois Gorges dans l'ouest de la Chine. En utilisant la détection par drone des pins morts et des données de terrain de 85 parcelles, les chercheurs comparent les peuplements purs de *P. massoniana*, les mélanges avec *Cunninghamia lanceolata* et les mélanges avec feuillus. Les mélanges *P. massoniana*/*C. lanceolata* montrent une occurrence significativement plus faible de la maladie que les peuplements purs, tandis que les mélanges avec feuillus présentent une occurrence plus élevée.

Titre	Categorie	Lien
Stand composition and admixture proportion shape pine wilt disease occurrence in <i>Pinus massoniana</i> forests	Méthode, outil et mesure de surveillance	lien

Dépérissement de la vigne

Veille sanitaire

Cet arrêté préfectoral définit le périmètre et les mesures de lutte contre la flavescence dorée sur six communes de l'Aisne : Barzy-sur-Marne, Passy-sur-Marne, Trélou-sur-Marne, Fossoy, Celles-les-Condé et Monthurel. L'insecte vecteur présente une génération annuelle, acquiert le phytoplasme lors de la piqûre d'un pied infecté et le transmet après un mois de latence. Sans mesures de contrôle, la maladie se propage rapidement et peut affecter la totalité des ceps en quelques années. Une surveillance obligatoire est maintenue au-delà des zones délimitées dans l'ensemble du vignoble champenois.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Arrêté Préfectoral 2026 - Lutte contre la flavescence dorée	Réglementation	France	Officielle	lien

Agrilus planipennis

Veille sanitaire

L'agrile du frêne (*Agrilus planipennis*), ravageur originaire d'Asie orientale, se rapproche de plus en plus de la Lituanie. En effet, il a été officiellement détecté à Gomel en Biélorussie en juin 2025, soit à 200 kilomètres de la frontière lituanienne. Ce coléoptère progresse de 40 à 80 kilomètres par an vers l'ouest depuis la Russie et l'Ukraine. La menace s'avère particulièrement critique pour les frênes lituaniens déjà décimés depuis trois décennies par la chalarose du frêne (*Hymenoscyphus fraxineus*).

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
The ash borer, a pest of the shiny beetle, is menacingly approaching Lithuania	Estimation du risque épidémiologique	Lituanie	Médiatique	lien

Toumeyella parvicornis

Veille sanitaire

Toumeyella parvicornis (la cochenille tortue du pin) continue son expansion géographique en Italie centrale, atteignant désormais la province de Viterbe dans le Latium après avoir affecté partiellement le sud de l'Italie et la région du Latium. La commune de Sutri constitue le seul foyer identifié dans cette province, les communes limitrophes étant classées en zone tampon selon les protocoles phytosanitaires en vigueur. Ce ravageur des pinèdes a nécessité des abattages préventifs sur l'axe Naples-Rome. Les mesures de gestion appliquées depuis 2021 comprennent la délimitation de zones de surveillance, l'application de protocoles obligatoires et la mise en œuvre du plan régional de lutte.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Italie : la cochenille tortue atteint la province de Viterbe	Evolution de l'état sanitaire	Italie	Médiatique	lien

Popillia japonica

Veille sanitaire

Cet article de vulgarisation présente les résultats de l'étude génomique publiée précédemment dans le [BHV-SV 2026/07](#), qui retrace les origines et les mécanismes de propagation de *Popillia japonica* en Suisse. L'analyse comparative du génome de 42 individus suisses avec des populations du Japon, d'Amérique du Nord, des Açores, d'Italie et du sud de la Suisse permet de reconstituer l'histoire évolutive et les voies d'invasion de cette espèce, en particulier les origines italiennes et nord-américaine des populations Suisses.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Les scarabées japonais présents en Suisse ont des origines italiennes et nord-américaines	Génétique des populations	/	Officielle	lien