

# Bulletin Hebdomadaire de Veille Sanitaire Internationale en Santé Végétale

Le Bulletin Hebdomadaire de Veille sanitaire internationale en Santé Végétale (BHV-SV) s'inscrit dans l'activité de veille sanitaire internationale menée dans le cadre de la Plateforme ESV (Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale -<https://www.plateforme-esv.fr/>). Le BHV-SV sélectionne et résume des actualités sanitaires et scientifiques en santé végétale qui sont parues dans la semaine.

**ATTENTION : Le contenu du document n'engage pas les membres de la Plateforme ESV.**



**Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale  
CC BY-NC-ND**

Code juridique

*Conformément aux productions réalisées par la Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale (ESV), celle-ci donne son droit d'accès à une utilisation partielle ou entière par les médias, à condition de ne pas apporter de modification, de respecter un cadre d'usage bienveillant et de mentionner la source © <https://plateforme-esv.fr/>*

## Sommaire

<i>Xylella fastidiosa</i> .....	2
<i>Bactrocera dorsalis</i> .....	3
Dépérissement de la vigne.....	4
<i>Spodoptera frugiperda</i> .....	4
Veille non ciblée : CYVCV.....	5

## Xylella fastidiosa

### Veille sanitaire

Cet article porte sur le contexte et les modalités de mise en place d'une réglementation européenne plus souple afin d'améliorer les mesures de gestion aux différents territoires touchés par *Xylella fastidiosa*, notamment selon la sous-espèce ou la souche bactérienne (voir la carte de l'UE associée). La Commission européenne a chargé l'EFSA de mettre à jour l'évaluation des risques pour permettre aux autorités phytosanitaires nationales de définir leur stratégie d'intervention en coordination avec la Commission.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Xylella: EU regulation to be amended for a more flexible approach is called for - L'Informatore Agrario	Réglementation	/	Médiatique	<a href="#">lien</a>

La présence de la bactérie *Xylella fastidiosa* a officiellement été détectée courant février 2026 dans la région de l'Alentejo, au Portugal. D'une part, dans une zone jusqu'ici indemne, au sein de la paroisse de Carvalhal située dans la commune de Grândola (ordonnance n°47/G/2026). Une zone délimitée a été mise en place, au sein de laquelle la sous-espèce *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* a été identifiée. D'autre part, au sein de la zone délimitée de Marvão, avec 43 nouveaux échantillons testés positifs et appartenant à la sous-espèce *fastidiosa* (ordonnance n° 46/G/2026).

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
The "Ebola of the plant world" has already reached the Alentejo region and threatens olive groves, vineyards, and cork oak forests.	Evolution de l'état sanitaire	Portugal	Médiatique	<a href="#">lien</a>

En Norvège, le programme de surveillance et de recensement de *Xylella fastidiosa* en 2025 n'a révélé aucune détection de la bactérie. Le rapport final des résultats de ce programme décrit le nombre et la nature des échantillons collectés et analysés. Il s'agit principalement d'échantillons provenant d'environnements de production, de circuits de distribution, de jardins botaniques, de parcs, de forêts et de vergers répartis sur le territoire norvégien.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Monitoring and mapping program for Xylella fastidiosa	Méthode, outil et mesure de surveillance	Norvège	Officielle	<a href="#">lien</a>

## Bactrocera dorsalis

### Veille sanitaire

Suite à la première occurrence confirmée de *Bactrocera dorsalis* en République slovaque en septembre 2025, une coopération internationale s'est établie avec la Belgique dans le cadre du projet PESTFLY. Ce projet, lancé pour identifier les routes d'introduction de cette mouche des fruits prioritaire en Europe, utilise une méthode génétique développée avec le Musée royal d'Afrique centrale pour déterminer l'origine géographique des spécimens capturés. L'Institut central de contrôle agricole de Bratislava a fourni deux échantillons d'adultes capturés en piège Jackson pour analyse ADN. Les résultats confirment une origine asiatique des individus slovaques.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
L'analyse génétique a confirmé l'origine asiatique des individus capturés de <i>Bactrocera dorsalis</i>	Génétique des populations	Slovaquie	Officielle	<a href="#">lien</a>

La mouche des fruits *Bactrocera dorsalis* a été identifiée pour la première fois en Espagne, dans un verger d'El Astillero, en Cantabrie. Des mesures d'éradication sont en cours.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Incursion of <i>Bactrocera dorsalis</i> in Spain	Evolution de l'état sanitaire	Espagne	Officielle	<a href="#">lien</a>

## Dépérissement de la vigne

### Veille sanitaire

Cet article médiatique donne accès à la carte officielle actualisée des foyers de flavescence dorée dans la région de Bourgueil (région Centre - Val de Loire).

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
La Flavescence dorée attaque le vignoble bourgueillois	Evolution de l'état sanitaire	France	Officielle	<a href="#">lien</a>

La DRAAF Bourgogne - Franche-Comté vient publier l'arrêté n° 2026-16 DRAAF BFC organisant la lutte contre la Flavescence dorée de la vigne et son vecteur en 2026 (à télécharger en bas de page). Une carte indique également les foyers et les zones de traitement obligatoire pour lutter contre le vecteur de la maladie en 2026.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Arrêté n°2026-16 DRAAF BFC	Evolution de l'état sanitaire	France	Officielle	<a href="#">lien</a>

## Spodoptera frugiperda

### Veille scientifique

Cette revue analyse et compare les mesures de biosécurité mises en place au Ghana et en Australie pour faire face à l'invasion de *Spodoptera frugiperda*, à partir d'études scientifiques et de documents techniques et politiques. En Australie, la gestion s'est appuyée sur un système national de biosécurité coordonné, avec des cadres juridiques, des capacités diagnostiques et des procédures structurées pour les ravageurs d'urgence. Malgré ces dispositifs, le ravageur s'est établi en 2020, conduisant rapidement à une stratégie de gestion à long terme plutôt qu'à l'éradication. Au Ghana, la réponse a été plus décentralisée et fondée sur les signalements des agriculteurs et les services de vulgarisation. Toutefois, les limites de la surveillance, des diagnostics et de la coordination nationale ont réduit les possibilités de confinement précoce et renforcé la dépendance à la lutte chimique. L'analyse comparative a mis en évidence plusieurs priorités pour améliorer la préparation et limiter les impacts sur la production et la sécurité alimentaire.

Titre	Categorie	Lien
Biosecurity responses to fall armyworm ( <i>Spodoptera frugiperda</i> ) in Ghana and Australia: Comparative analysis and practical implications	Méthode et mesure de lutte, Méthode, outil et mesure de surveillance	<a href="#">lien</a>

## Veille non ciblée : CYVCV

### Veille sanitaire

Compte tenu de l'impact potentiel de cette maladie émergente sur la production d'agrumes, le secrétariat de l'EPPO a estimé que le CYVCV (Citrus yellow vein clearing virus : *Potexvirus citriflavivenae*) devrait être ajouté à la liste d'alerte de l'EPPO. En Italie, le virus a été détecté au printemps 2024 dans la région de Campanie et du Latium. En Espagne, il a été détecté dans les communautés autonomes de Catalogne et de Valence en automne 2025.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
EPPO Alert List – <i>Citrus yellow vein clearing virus (Potexvirus citriflavivenae)</i>	Evolution de l'état sanitaire	/	Médiatique	<a href="#">lien</a>