

Bulletin Hebdomadaire de Veille Sanitaire Internationale en Santé Végétale

Le Bulletin Hebdomadaire de Veille sanitaire internationale en Santé Végétale (BHV-SV) s'inscrit dans l'activité de veille sanitaire internationale menée dans le cadre de la Plateforme ESV (Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale -<https://www.plateforme-esv.fr/>). Le BHV-SV sélectionne et résume des actualités sanitaires et scientifiques en santé végétale qui sont parues dans la semaine.

ATTENTION : Le contenu du document n'engage pas les membres de la Plateforme ESV.



**Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale
CC BY-NC-ND**

Code juridique

Conformément aux productions réalisées par la Plateforme d'Épidémiosurveillance en Santé Végétale (ESV), celle-ci donne son droit d'accès à une utilisation partielle ou entière par les médias, à condition de ne pas apporter de modification, de respecter un cadre d'usage bienveillant et de mentionner la source © <https://plateforme-esv.fr/>

Sommaire

Veille non ciblée, <i>Erthesina fullo</i>	2
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	3
<i>Popillia japonica</i>	5
<i>Agrilus planipennis</i>	5
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	6

Dépérissement de la vigne, <i>Xylella fastidiosa</i>	7
<i>Xylella fastidiosa</i>	7

Veille non ciblée, *Erthesina fullo*

Veille sanitaire

L'EPPO a inscrit sur sa liste d'alerte *Erthesina fullo*, une punaise très polyphage originaire d'Asie, apparentée à la punaise diabolique (*Halyomorpha halys*). Déjà établie en Albanie, avec des signalements isolés en Belgique, en Grèce et en Italie, ainsi que des interceptions en République tchèque, cette espèce se déplace sur de longues distances essentiellement à la faveur des transports humains, en « auto-stoppeuse », dans les conteneurs, les véhicules et les bagages. L'adulte, de 18 à 23 mm, brun foncé à noir et tacheté de jaune ou d'orange, s'attaque à plus de 60 espèces végétales réparties dans une trentaine de familles botaniques, dont le kiwi, la poire, la pomme, la pêche, l'abricot, la grenade, le jujube, les agrumes et le macadamia, ainsi qu'à des essences forestières et ornementales comme le tilleul, le robinier, le peuplier et l'orme. En piquant feuilles, fleurs, pousses et fruits, nymphes et adultes provoquent décolorations, flétrissements, défoliations et déformations des fruits, les piqûres de nutrition pouvant en outre favoriser des infections bactériennes et fongiques. Dans son aire d'origine, les pertes atteignent 10 à 30 % sur kiwi, jusqu'à 60 % sur poirier et environ 20 % sur pommier et macadamia, bien que l'ampleur des dégâts dans les zones récemment envahies reste incertaine. L'espèce n'est pas encore réglementée comme organisme de quarantaine dans l'UE, ni inscrite sur les listes A1 ou A2 de l'OEPP ; son inscription sur la liste d'alerte vise à encourager une surveillance précoce, sans créer d'obligation réglementaire.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Erthesina fullo, a new pest on the EPPO Alert List	Réglementation	/	Médiatique	lien

Bursaphelenchus xylophilus

Veille sanitaire

L'EPPO fait le point sur la situation du nématode du pin (*Bursaphelenchus xylophilus*, liste A2) en France, où il avait été signalé pour la première fois en novembre 2025 à Seignosse (Landes), puis à Angresse en mars 2026. Le 16 juillet 2026, le laboratoire national de référence a confirmé sa détection sur un pin laricio symptomatique, à partir d'un échantillon prélevé lors de prospections officielles en zone urbaine à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), à 60 km de la zone délimitée landaise. Une nouvelle zone a été délimitée et deux pins ont été abattus le 21 juillet. Le nématode a par ailleurs été détecté en juillet sur un *Monochamus* sp. piégé dans le Loiret (une première en Centre-Val de Loire). Qualifiée d'interception faute de détection sur un arbre, une surveillance renforcée a été mise en place. Deux autres captures positives de *Monochamus* sp. ont eu lieu dans la zone tampon du foyer landais. Statut officiel : présent, uniquement dans certaines parties du territoire, en cours d'éradication.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
EPPO Global Database	Evolution de l'état sanitaire	France	Officielle	lien

Le DEFRA britannique signale de nouvelles exigences françaises applicables depuis le 1er septembre 2026 aux emballages en bois accompagnant les marchandises soumises aux contrôles sanitaires et phytosanitaires à l'importation. Instaurés par le SIVEP, ces contrôles nationaux font suite au foyer de nématode du pin (*Bursaphelenchus xylophilus*) dans les Landes. Le marquage NIMP 15, attestant un traitement thermique ou une fumigation, reste obligatoire et inchangé. Nouveauté : tout emballage en bois (palettes, caisses et assimilés) accompagnant ces marchandises doit désormais faire l'objet d'une notification CHED-PP dans TRACES, distincte de celle éventuellement requise pour la marchandise elle-même, avec mention du numéro de l'installation de traitement figurant sur le bois. L'obligation incombe au responsable de la marchandise ; pour les produits d'origine animale, les vétérinaires officiels n'ont pas à certifier les exigences relatives à l'emballage. Le DEFRA, avec la Forestry Commission et l'ONPV française, doivent encore préciser le champ exact d'application.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
New French requirements for wooden packaging material used for transporting goods - British International Freight Association	Réglementation	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	Médiatique	lien

Veille scientifique

Une étude quantifie à l'échelle nationale les pertes de carbone forestier causées par le flétrissement du pin en Chine, épidémie qui menace la fonction de puits de carbone des forêts du pays. Les auteurs combinent données de télédétection multi-sources et surveillance nationale, via une méthode de changement d'échelle « peuplement-arbre » fondée sur l'apprentissage d'ensemble, qui reconstitue la biomasse moyenne par arbre à partir d'observations satellitaires, puis une approche ascendante agrégeant les pertes des foyers locaux jusqu'au niveau national. De 1998 à 2022, la maladie aurait entraîné une perte cumulée de 12,06 Tg de carbone, soit environ 12 millions de tonnes (fourchette selon les scénarios : 9,88 à 15,79 Tg). La dynamique se décompose en trois phases ; accumulation latente, diffusion, croissance explosive, avec un basculement en 2017 : les foyers migrent alors de la côte sud-est vers le bassin du Yangtsé et les habitats favorables du nord. L'analyse paysagère montre enfin qu'ils se concentrent près des lisières forestières, dont ils précèdent le recul.

Titre	Categorie	Lien
Biological invasions Erode China's forest carbon stocks: Spatiotemporal expansion and edge preferences of Pine Wilt Disease	Risque et impact socio-économique et environnemental	lien

L'EFSA a évalué si les jeunes plants de pin destinés au boisement ou au reboisement peuvent constituer une voie de transmission du nématode du pin (*Bursaphelenchus xylophilus*), dont la propagation dépend du coléoptère vecteur *Monochamus galloprovincialis*. Ces plants, âgés de deux ans au plus et d'un diamètre au collet inférieur à 12 mm, sont jugés physiquement trop petits pour que le vecteur y accomplisse son cycle : la capsule céphalique des larves de stade L2 (0,89 à 1,03 mm) dépasse l'épaisseur du phloème d'un pin de deux ans (0,44 mm), et la chambre nymphale requise déborderait du rayon de 6 mm du plant. L'examen de plus de 2 000 trous de sortie confirme que l'insecte a besoin de branches de plus de 20 mm de diamètre, la médiane s'établissant à 90 mm. Une transmission sans vecteur, par contact entre racines blessées, est jugée incompatible avec les bonnes pratiques. Le panel conclut que ces plants ne constituent pas une voie de transmission.

Titre	Categorie	Lien
Panel statement on young pine plants used for afforestation or reforestation as pathway for pinewood nematode (PWN) <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Estimation du risque épidémiologique	lien

Popillia japonica

Veille sanitaire

Cette étude évalue la gamme d'hôtes physiologique d'*Istocheta aldrichi*, mouche parasitoïde utilisée en lutte biologique classique contre le scarabée japonais (*Popillia japonica*, liste A2 de l'OEPP) aux États-Unis et au Canada, où elle atteint jusqu'à 70 % de parasitisme, contre 90 % dans son aire d'origine, au Japon. Introduite aux Açores en 1993, elle ne semble pas s'y être établie, et n'a jusqu'ici été signalée que sur *P. japonica*, tant dans son aire native que dans son aire d'introduction. Pour identifier les espèces sur lesquelles elle peut se reproduire et achever son cycle en conditions confinées, les auteurs ont mené des tests de laboratoire sans choix sur 14 espèces européennes de Scarabaeidae non ciblées, réparties en trois sous-familles. Cinq d'entre elles ont fait l'objet de pontes. Le développement complet du parasitoïde n'a toutefois abouti que sur deux Rutelinae, *Mimela junii* et *Anomala vitis*. Les auteurs appellent à étudier la gamme d'hôtes écologique de la mouche avant d'envisager son usage en Europe.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
EPPO Global Database	Méthode et mesure de biocontrôle	/	Officielle	lien

Agrilus planipennis

Veille sanitaire

L'EPPO fait le point sur la situation de l'agrile du frêne (*Agrilus planipennis*, liste A2) en Hongrie, où il a été signalé pour la première fois en juin 2026 à Beregsurány (est du pays), après la capture d'un adulte dans un piège. Les prospections menées depuis ont permis de capturer d'autres adultes et de détecter des larves sur des frênes symptomatiques. Le ravageur a ensuite été repéré dans le comté voisin de Borsod-Abaúj-Zemplén, où sept adultes ont été piégés et où plusieurs frênes (*Fraxinus* spp.) présentaient des symptômes caractéristiques : fissures de l'écorce et trous de sortie en forme de D. Une zone délimitée a été établie et les prospections se poursuivent pour en préciser l'étendue. Des mesures phytosanitaires officielles d'éradication sont mises en œuvre, comprenant prospections et actions de communication. Le statut du ravageur en Hongrie est officiellement déclaré comme suit : transitoire, actionnable, en cours d'éradication.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
EPPO Global Database	Evolution de l'état sanitaire	Hongrie	Officielle	lien

L'EPPO fait le point sur la situation de l'agrile du frêne (*Agrilus planipennis*, liste A2) en Slovaquie, où il a été signalé pour la première fois en juin 2026 à Streda nad Bodrogom (district de Trebišov), puis confirmé le 20 juillet par le laboratoire de référence de l'UE. Au 7 août 2026, sur 2 297 sites prospectés, 115 sites hébergeant des plantes hôtes étaient considérés comme infestés dans les districts de Trebišov et de Michalovce, pour une surface totale de 62 208 hectares. Une zone tampon de 10 km a été établie et le déplacement de végétaux et produits végétaux de frêne (*Fraxinus* spp.) et d'arbre à franges (*Chionanthus virginicus*) est interdit dans un rayon de 100 km. Statut officiel : transitoire, actionnable, en cours d'éradication.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
EPPO Global Database	Evolution de l'état sanitaire	Slovaquie	Officielle	lien

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Veille sanitaire

L'EPPO signale la première détection de *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (liste A2) en Croatie. Dans le cadre du programme national de surveillance 2026, la bactérie a été détectée en juin sur des plants de haricot commun (*Phaseolus vulgaris*) dans un champ de 0,6 hectare, sur la commune de Našice (comitat d'Osijek-Baranja). L'identification a été confirmée par des tests moléculaires en août 2026. L'origine du foyer reste inconnue. Le statut de l'organisme nuisible en Croatie est officiellement déclaré comme suit : présent, en cours d'éradication.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
EPPO Global Database	Evolution de l'état sanitaire	Croatie	Officielle	lien

Dépérissement de la vigne, *Xylella fastidiosa*

Veille sanitaire

La découverte, en mai 2026, de la cicadelle pisseuse (*Homalodisca vitripennis*) dans des vignes de Californie alarme les autorités, qui y voient une menace sérieuse pour la filière viticole de l'État, évaluée à 73 milliards de dollars. Cet insecte est le principal vecteur de *Xylella fastidiosa*, responsable de la maladie de Pierce. L'infestation, où tous les stades de développement ont été observés, a été attribuée à un chargement de plants ornementaux en provenance du Texas, entré dans l'État sans inspection ni étiquette de mise en quarantaine, certains végétaux portant des œufs du ravageur. Des traitements sont en cours dans les comtés de Shasta et de Stanislaus, tandis que des opérations de piégeage et d'inspection sont déployées dans plusieurs autres comtés.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
Growers urge state to step up glassy-winged sharpshooter trapping and treatment	Evolution de l'état sanitaire	États-Unis d'Amérique	Médiatique	lien

Xylella fastidiosa

Veille sanitaire

Xylella fastidiosa a été détectée pour la première fois en Calabre, à Taurianova (province de Reggio de Calabre), a annoncé Gianluca Gallo, responsable de l'Agriculture au sein de l'exécutif régional. Le décret régional pris à la suite des contrôles confirme la présence de la bactérie sur sept oliviers, sur les 35 échantillonnés au lieu-dit Olivetella. Une zone infectée de 50 mètres de rayon et une zone tampon de 2,5 km ont été délimitées, s'étendant sur les communes de Taurianova, Cittanova et Terranova Sappo Minulio : des mesures d'éradication y sont prévues, assorties d'une surveillance renforcée dans la zone tampon.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
An outbreak of <i>Xylella fastidiosa</i> has been identified in the Taurianova area: information and measures announced by the Calabria Region.	Evolution de l'état sanitaire	Italie	Officielle	lien

En Basilicate, en Italie, la présence de *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* a été confirmée sur un amandier à Ciccolocane, dans la province de Matera, à la limite des Pouilles (province de Bari). Selon Carmine Cicala, responsable de l'Agriculture au sein de l'exécutif régional, cette détection résulte de la surveillance conduite par le Service phytosanitaire régional, engagée en 2013 et intensifiée depuis 2024 dans les zones limitrophes des Pouilles, à la suite de détections de la même sous-espèce dans les territoires voisins. Les analyses de l'Alsia Metapontum Agrobios ont été confirmées par le CREA Difesa e Certificazione, à Rome. L'arbre positif se situe dans une zone tampon déjà sous surveillance. Le Service phytosanitaire poursuivra les prélèvements dans le secteur et appliquera les mesures réglementaires prévues, dont l'arrachage de l'arbre positif.

Titre	Categorie	PaysSujet	Fiabilite	Lien
The presence of Xylella has been confirmed in the Matera area, on the border with Puglia.	Evolution de l'état sanitaire	Italie	Médiatique	lien